



CENTRO DE POLÍTICAS
PÚBLICAS E INNOVACIÓN
EN SALUD

RETRASOS GES EN CÁNCER CERVICOUTERINO

OCTUBRE

2023

Resumen

Los retrasos GES en cáncer han estado en un constante aumento según las publicaciones institucionales del Ministerio de Salud. Desde hace un año el Centro de Políticas Públicas e innovación en Salud (CIPS) de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo ha investigado estos atrasos del sistema público según patología e intervención sanitaria. En este nuevo informe nos enfocamos entorno a los atrasos específicos de cáncer cervicouterino, el cual es el que tiene más retrasos en cáncer a nivel nacional. Este análisis se realizó a partir de datos públicos de la subsecretaría de Redes Asistenciales y de datos obtenidos a través de la Ley de Transparencia.

Entre finales del año 2022 y el segundo trimestre del 2023 (corte de los datos al 30 de junio), disminuyeron los retrasos de cáncer cervicouterino en solo 0,87% (4.343 a 4.305), manteniéndose como la garantía GES de cáncer con mayor cantidad de retrasos registrados. Al comparar estos datos anuales, tanto entre el 2019 y 2020 han aumentado los atrasos de esta garantía explícita en salud en 114,54% (399 a 856). Este aumento fue aún más pronunciado entre 2020 y 2021 cuyo aumento fue del 219,51% (856 a 2.735). Posteriormente, entre 2021 y 2022 se observa otro aumento de estas garantías en 58,9% (2.735 a 4.343). La primera baja se observa entre 2022 y mediados del 2023, con una pequeña disminución poco significativa de 0,87% (4.343 a 4.305).

Al analizar los retrasos GES cáncer por regiones, se puede identificar que seis de las 16 regiones del país presentan que cáncer cervicouterino es su garantía con mayor cantidad de atrasos en prestaciones relacionadas a cáncer. Las regiones que presentan mayor cantidad de atrasos en cáncer cervicouterino a mediados del 2023 son: Coquimbo (949); Metropolitana (943); Araucanía (751); Valparaíso (501) y Maule (481). Por otro lado, las regiones que presentan menor cantidad de retrasos GES cáncer cervicouterino son: Arica y Parinacota (0); Magallanes (8); Atacama (11); Aysén (19) y Los Ríos (21). Estos datos sugieren que la mayor cantidad de retrasos por cáncer cervicouterino se concentran tanto para la macrozona Centro, representando el 33,7% del total de retrasos por esta prestación y la zona Centro Sur, con el 21,1% del total.

Finalmente se analizaron las intervenciones sanitarias de los retrasos relacionados a esta prestación GES. En ello se observa que 51,2% de los retrasos en cáncer cervicouterino (2.194) son por diagnóstico; 35,5% por tamizaje (1.527); 11% tratamiento (485) y 2,3% seguimiento (98). Al revisar las intervenciones sanitarias por región, se identifica que las regiones que presentan mayor cantidad de atrasos en tamizaje son: Coquimbo 54% del total de atrasos en tamizaje (822); Maule 15% (224); Metropolitana 9% (131); Ñuble 6% (93) y Araucanía 5% (76). Además, en diagnóstico las regiones que presentan mayor cantidad de atrasos en esta intervención son: Metropolitana 32,2% (710); Araucanía 29,6% (653); Valparaíso 13,3% (294); Maule 8% (177) y Coquimbo 5,1% (113). Mientras que para tratamiento son: Valparaíso 30,5% (145); Maule 16,8% (80); Metropolitana 16,2% (77); Biobío 10,1% (48) y O'Higgins 7,6% (36).

Estos datos sugieren la importancia de crear programas de acción específicas para disminuir de forma significativa los retrasos GES de cáncer cervicouterino, sobre todo en las regiones de Coquimbo, Metropolitana, Araucanía, Valparaíso y Maule enfocándose en las intervenciones sanitarias de diagnóstico y tamizaje, las cuales son claves para poder tener una confirmación de la enfermedad a tiempo y un mejor manejo de la enfermedad. Especial énfasis hay que poner en Coquimbo donde el cáncer cervicouterino representa el 70% de todos los retrasos de cáncer de la región, principalmente en tamizaje. En la Región Metropolitana, Araucanía y Valparaíso, en cambio, el foco hay que ponerlo en la disminución de retrasos GES en cáncer cervicouterino en diagnóstico. En ese sentido, como CIPS-UDD instamos a las autoridades locales y regionales a revisar los retrasos para que a nivel nacional se tenga información actualizada de sus pacientes y se puede crear una estrategia acorde a la realidad de cada región. Urge, además, visibilizar desde las políticas públicas y comunicación la importancia de los chequeos preventivos y disminuir las barreras de accesos de las personas a estos exámenes.

Retrasos garantías GES en cáncer cervicouterino diciembre 2019-2023

En lo que respecta a los retrasos de cáncer cervicouterino, se observa un aumento significativo en los períodos analizados. Entre 2019 y 2020 los retrasos de esta prestación aumentaron en un 114,54% (399 a 856). Este aumento se hizo más evidente entre el 2020 y 2021 cuyo aumentó fue del 219,51% (856 a 2.735). Posteriormente, entre 2021 y 2022 se presencia otro aumento de estas garantías en 58,9% (2.735 a 4.343) y finalmente entre 2022 y mediados del 2023, existe una pequeña disminución de 0,87% (4.343 a 4.305), la cual no es significativa.

Tabla 1. Total de retrasos en garantías GES en cáncer cervicouterino 2019-2023 (Junio 2023).

Año	Total de retrasos GES cáncer generales	Total de retrasos GES cáncer cervicouterino	Variación porcentual retrasos GES general respecto al año anterior	Variación porcentual retrasos cáncer cervicouterino respecto al año anterior
2019	2.717	399	32,80%	7,26%
2020	4.909	856	80,68%	114,54%
2021	10.062	2.735	104,97%	219,51%
2022	13.469	4.343	33,86%	58,90%
2023 (30 de junio)	15.905	4.305	18,09%	-0,87%

Fuente: Elaboración propia CIPS-UDD a partir de las glosas 06 de los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.

Retrasos garantías GES cáncer cervicouterino y regiones (2023)

- Al analizar los retrasos GES cáncer por regiones, se puede identificar que, en seis de las 16 regiones, el cáncer cervicouterino representa la mayoría de los atrasos dentro de las prestaciones relacionadas con el cáncer.
- Las regiones que presentan mayor cantidad de atrasos en cáncer cervicouterino a mediados del 2023 son: Coquimbo (949); Metropolitana (943); Araucanía (751); Valparaíso (501) y Maule (481). En tanto, las regiones que presentan menor cantidad de retrasos GES cáncer cervicouterino son: Arica y Parinacota (0); Magallanes (8); Atacama (11); Aysén (19) y Los Ríos (21).

- Cabe destacar que, dentro de la cifra total de atrasos en cáncer reportados por región, una parte significativa corresponde al cáncer cervicouterino. Los porcentajes más altos atribuidos a esta prestación en cáncer se observan en: Coquimbo (70%); Araucanía (48%); Ñuble (37%); Maule (34%) y Atacama (27%).

Tabla 2. Total de garantías GES en cáncer cervicouterino atrasadas y porcentaje respecto al total de atrasos GES cáncer general.

Región	Total de retrasos GES cáncer generales	Total de retrasos GES cáncer cervicouterino	Porcentaje Relación cáncer cervicouterino
Antofagasta	303	80	26%
Arica y Parinacota	2	-	0%
Atacama	41	11	27%
Aysén	71	19	27%
Biobío	1.944	174	9%
Coquimbo	1.352	949	70%
Araucanía	1.572	751	48%
Valparaíso	2.696	501	19%
Maule	1.435	481	34%
Los Lagos	640	100	16%
Los Ríos	406	21	5%
Magallanes	117	8	7%
Metropolitana	4.251	934	22%
Ñuble	265	98	37%
O'Higgins	730	157	22%
Tarapacá	80	21	26%


Fuente: Elaboración propia CIPS-UDD a partir de datos otorgados por transparencia segundo trimestre 2023

Intervención sanitaria retrasos garantías GES cáncer cervicouterino y regiones (2023)

- También se analizaron las intervenciones sanitarias de los retrasos relacionados a esta prestación GES. En ello se observa que 51,2% de los retrasos en cáncer cervicouterino (2.194) son por diagnóstico, mientras que 35,5% se relaciona con problemas en el tamizaje (1.527). Además, el 11% se deben en retrasos respecto al tratamiento (485) y 2,3% seguimiento (98).
- Al examinar las intervenciones sanitarias por región, se identifica que las regiones que presentan mayor cantidad de atrasos en tamizaje son: Coquimbo 54% del total de atrasos en tamizaje (822); Maule 15% (224); Metropolitana 9% (131); Ñuble 6% (93) y Araucanía 5% (76).

- En cuanto al diagnóstico se observa otro escenario, las regiones que presentan mayor cantidad de atrasos en esta intervención son: Metropolitana 32,2% (710); Araucanía 29,6% (653); Valparaíso 13,3% (294); Maule 8% (177) y Coquimbo 5,1% (113).
- Finalmente, para el caso del tratamiento, donde se presentan la mayor cantidad de prestaciones atrasadas son: Valparaíso 30,5% (145); Maule 16,8% (80); Metropolitana 16,2% (77); Biobío 10,1% (48) y O'Higgins 7,6% (36).

Gráfico 1. Retrasos cáncer cervicouterino e intervención sanitaria 2023 (30 de junio).



Fuente: Elaboración propia CIPS-UDD a partir de datos otorgados por transparencia segundo trimestre 2023

Tabla 3. Total de garantías GES atrasadas en cáncer cervicouterino, intervención sanitaria por región 2023.

Región	Tamizaje	Diagnóstico	Tratamiento	Seguimiento
Antofagasta	37	26	16	1
Arica y Parinacota	0	0	0	0
Atacama	1	4	6	
Aysén	4	12	3	
Biobío	38	88	48	
Coquimbo	822	113	13	
Araucanía	76	653	22	
Valparaíso	60	294	145	2
Maule	224	177	80	
Los Lagos	7	17	4	72
Los Ríos	1	1	19	
Magallanes	1	5	2	
Metropolitana	131	710	77	16
Ñuble	93	1	4	
O'Higgins	32	83	36	6
Tarapacá		20		1
Total	1.527	2.204	475	98

Fuente: Elaboración propia CIPS-UDD a partir de datos otorgados por transparencia segundo trimestre 2023

CENTRO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E INNOVACIÓN EN SALUD



CIPS UDD

Facultad de Gobierno



Av. La Plaza 680, Las Condes



+56 2 258 756 87



@cips_udd



@cips.udd